

15. *Helvella spadicea* Schaeff.

[dal greco *spadix*, “ramo di palma da datteri”, per il colore rossastro simile a quello dei datteri]

Sinonimi

Helvella leucopus Pers.

Helvella monachella (Scop.) Fr. ss. Quéf.

Classe *Ascomycetes*

Ordine *Pezizales*

Famiglia *Helvellaceae*



Apotecio

Formato da 2-3-4 lobi ripiegati e saldati tra loro parzialmente con depressione centrale a forma di sella, diametro di 30-50 (80) mm. Superficie imeniale di colore bruno bistro, bruno-nero, anche nero lucente (ma in qualche caso nocciola pure a completa maturità!). Superficie sterile (faccia inferiore) liscia, biancastra, bruniccia negli individui anziani.

Gambo

40-80 (120) x 10-20 (30) mm, liscio, di consistenza ceracea, cilindrico, senza costolature, irregolarmente compresso o solo con accenno di solcatura basale, di solito con base debolmente clavata; completamente cavo. Colore bianco con tendenza a sfumature grigie nei vecchi esemplari.

Carne


Sottile, elastica, bianca, con odore e sapore insignificanti.

Microscopia

Spore: 20-25 x 13-15 μm , ialine, ellittiche, lisce, dotate di grossa guttula centrale e diverse altre piccole ai poli; aschi: 300-350 x 14-17 μm , non amiloidi; parafisi: settate, sottili, cilindrico-flessuose, con sommità claviforme larga fino a 8 μm ; excipulum: formato da uno strato di cellule catenulate.

Habitat

Specie tra le più comuni durante la primavera, in grandi colonie, sul terreno sabbioso sotto pioppi. Le Casse di Colmata costituiscono una delle "stazioni" veneziane classiche di questa specie.



Microscopia

Commestibilità

Commestibile di modesta qualità, di consistenza elastica, solo dopo cottura.

Note

Classica specie facilmente identificabile per lo stacco cromatico dei colori scuri del cappello ed il bianco candido, ceraceo, dello stipite (*leocopus* = con il gambo bianco). Ma il carattere che più di tutti rende riconoscibile *H. spadicea* è costituito dal cappello, dalla caratteristica forma di copricapo ecclesiastico (da cui il nome di *H. monachella*). Nei medesimi ambienti, *H. spadicea* potrebbe venir confusa con altre due helvelle stipitate e con cappello a forma di sella: ci riferiamo a *H. lacunosa* Afz.: Fr. e a *H. fusca* Gill.; ambedue possiedono, però, il gambo fortemente costolato. *H. lacunosa* è specie a presenza autunnale ed il colore della sua mitria varia dal grigio al nerastro, con il gambo grigiastro; *H. fusca*, tardo-primaverile, ha cappello rosso-brunastro o bruno-castano, ed il suo gambo è beige.