

24. *Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke

[dal latino *nudus*, “nudo”, per l’aspetto liscio del cappello]

Sinonimi

Tricholoma nudum (Bull.: Fr.) Quéf.

Rhodopaxillus nudus (Bull.: Fr.) Maire

Nome comune

agarico violetto

Classe *Basidiomycetes*

Subclasse *Hymenomycetidae*

Ordine *Agaricales*

Famiglia *Tricholomataceae*



Cappello

Da emisferico a convesso, infine appianato, anche leggermente depresso; liscio, pruinoso al margine, più umido al centro, spesso con largo umbone; margine dapprima involuto, poi disteso, spesso lobato; colore ocre-violaceo tendente a schiarirsi con l'età fino ad assumere sfumature bruno-fulve; diametro 60-150 (180) mm di diametro.

Lamelle

Fitte, intercalate da lamellule, con tagliente spesso eroso; sinuato-smarginate al gambo, facilmente separabili dalla carne; colore violaceo, tendente a schiarirsi con l'età.

Gambo

Cilindrico, un po' bulboso alla base, con numerose ife miceliari; pieno, spugnoso; concolore al cappello, fibrilloso, con pruinosità biancastre; 40-100 x 15-30 mm.

Carne


Tenera, cedevole al centro del cappello; colore violaceo chiaro, con sfumature ocracee alla base del gambo; sapore acidulo, odore molto pronunciato, terroso.

Microscopia

Spore rosa in massa, ellittiche, minutamente verrucose, 6-8 x 3-5 μm ; basidi clavati, 25-30 x 6-8 μm .

Habitat

Molto comune, ubiquitario, saprofita su residui vegetali marcescenti; da primavera ad autunno inoltrato.



Microscopia

Commestibilità

Commestibile, con prudenza, essendo stati segnalati casi di intossicazione.

Note

È un fungo di buona resa, ma non a tutti gradito per il sapore e l'aroma molto intensi; se ne consiglia il consumo di qualche esemplare nei misti, associato a funghi più delicati (qualcuno ne consiglia una rapida prebollitura).

La specie è confondibile con le affini *Lepista sordida* (Fr.) Singer e *Lepista saeva* (Fr.) Orton, di taglia più piccola, dai colori più o meno lilacei, entrambe commestibili e con alcuni *Cortinarius* violacei, non commestibili, che si distinguono per la tipica "cortina" simile a una ragnatela e per le lamelle rese di colore ocraceo dal colore delle spore in massa.