

29. *Agaricus impudicus* (Rea) Pilat

[dal latino *impudicus*, “impudico”, per il suo odore sgradevole*]

Sinonimi

Psalliota variegata Moell.

Psalliota brunneola J.E.Lange

Classe *Basidiomycetes*

Subclasse *Hymenomycetidae*

Ordine *Agaricales*

Famiglia *Agaricaceae*



* L'aggettivo “impudico” è, di norma, associato all'aspetto più che all'odore.

Cappello

50-120 mm, da convesso a più aperto-disteso, a volte con la parte centrale piana o depressa; cuticola presto dissociata, lacerata, in squame disposte concentricamente, la parte centrale bruno-nocciola, bruno scuro, più chiaro verso il margine; a volte presenta residui membranosi del velo generale, bordo appendicolato.

Lamelle

Da bianche a rosa carnicino, poi violetto-bruno scuro, nel fungo giovane le lamelle allo sfregamento si macchiano fugacemente di colore rosato-vinoso, fitte, libere al gambo, filo più chiaro.

Gambo


Fino a 120-140 x 15 mm cilindrico, presto slanciato, clavato, bulboso, nella parte bassa da nudo a fibrilloso, fioccoso, bianco con resti di micelio ramificati, nella parte alta di colore rosa-violetto, con anello supero, largo, sottile, bianco o con macchie brune lungo il margine inferiore.

Carne

Bianca, tende leggermente ad arrossare verso la base, odore più o meno evidente (secondo Moeller è sgradevole, come di *Lepiota cristata*).

Microscopia

Spore 5-6 x 3-3,5 µm, ovoidali, ellittiche con apicolo sotto la base, colore bruno-porpora in massa.



Microscopia

Habitat

Lettiere di conifera e latifoglia, in particolare nei litorali, estate-autunno.

Commestibilità

Commestibile.

Note

Specie d' *Agaricus* molto comune nella costa adriatica, si può confondere con *Agaricus silvaticus* J.C. Schaeffer: Fr., molto più arrossante.