

35. *Cortinarius caligatus* Malençon

[dal latino *caligatus*, “calzato”, per la decorazione a bande sul gambo]

Classe *Basidiomycetes*
Subclasse *Hymenomycetidae*
Ordine *Agaricales*
Famiglia *Cortinariaceae*



Cappello

40-100 mm, emisferico, convesso, poi piano, a volte presenta un cenno di largo umbone al centro, con bordo cadente o involuto, lubrificato poi asciutto, fibrilloso, squamuloso al disco, beige-brunastro, poi con toni rossastri.

Lamelle

Adnate-uncinate al gambo, fitte, con lamellule; leggermente larghe, di colore violetto vivace, con il filo più segnato, violetto scuro e crespato.

Gambo


50-90 x 12-15 mm, fusoide, attenuato in basso, talvolta ricurvo, bianco sericeo verso l'alto, brunastro verso la base con armilla a bande e squame giallobruno, terminante con una zona annuliforme ben distinta.

Carne

Spessa, soda, bianca con qualche macchia bruna sul fondo del gambo, sapore mite, odore insignificante o poco distinto.

Microscopia

Spore 9-12 x 6-7,5 μm , ellittiche o amigdaliformi, grossolanamente verrucose, sporata bruno-ruggine.



Microscopia

Habitat

Sotto querce sempreverdi termofile, in ambiente mediterraneo o meridionale in autunno.

Commestibilità

Commestibile.

Note

Cortinarius con vistose decorazioni sul gambo, caratterizzato da un velo armilloide \pm evidente; da altre specie di *Phlegmacium* (sottogenere a cui appartiene la specie in oggetto) si distingue per il colore delle lamelle viola vivace, con filo più scuro.