

## 41. *Russula ilicis* Romagn., Chevassut & Privat

[dal latino *Quercus ilex*, "leccio", per il suo habitat]

Classe *Basidiomycetes*  
Subclasse *Hymenomycetidae*  
Ordine *Russulales*  
Famiglia *Russulaceae*



*Cappello*

Molto carnoso e consistente da giovane, 50-120 mm di diametro, convesso, appiattito in cima, fossetta ombelicale, pian piano espanso, a volte ondulato, lobato o ricurvo. cuticola asportabile per un terzo del raggio, la cuticola bagnata è untuosa, di colore pallido ceruleo, grigio chiaro, tendente al rosa chiaro tenue, con macchioline rugginose, più o meno estese.

*Lamelle*

Disuguali, intercalari, arcuate, da sublibere al gambo, a discendenti-adnate, di colore bianco, a maturità fragili di color crema, filo concolore a volte macchiato leggermente di bruno.

*Gambo*


Fino a 60x30 mm, cilindrico, attenuato sotto le lamelle, rugoso, pieno, bianco, pruinoso verso l'alto, sodo da giovane.

*Carne*

Bianca, compatta e consistente, odore impercettibile o fruttato al taglio, sapore mite.

*Microscopia*

Spore 6-8 x 6-7,5 µm, ovoidali, o subglobose, verrucose, parzialmente reticolate, di colore crema, piuttosto scuro.



Microscopia

*Habitat*

Specie xerofila del leccio, raccolta in zona mediterranea del Nord-Est d'Italia (Veneto).

*Commestibilità*

Commestibile.

*Note*

Caratteristica per il suo legame con *Quercus ilex*, comune in certe località, in terreni calcarei più abbondante, si può trovare con colori rosa-violetto, o giallino con sfumature verdastre.