

## 43. *Sowerbyella imperialis* (Peck) Korf

[dal latino *imperialis*, “imperiale”, per l’aspetto vistoso]

Classe *Ascomycetes*  
Ordine *Pezizales*  
Famiglia *Pezizaceae*



*Apotecio*

A forma di coppa,  $\pm$  lungamente pedunculata e margine incurvato, con dimensione fino a 40 mm, cupolato in modo variabile, imenoforo nella faccia interna liscio e opaco, talvolta con qualche piega al centro di un bel colore arancio luminoso, faccia esteriore crema-forforacea.

*Gambo*

Presenta un piccolo piede radicante, feltrato.

*Carne*


Ceracea, biancastra, sapore ed odore non espressivi.

*Microscopia*

Spore 12-15 x 6-7,5  $\mu$ m, ellittiche, ialine, finemente punteggiate, mono-biguttulate, aschi ottosporici 250 x 12  $\mu$ m; parafisi con sommità clavata fino a 5  $\mu$ m, settate e ramificate.

*Habitat*

In boschi misti o di conifere in suolo calcareo.



Microscopia

*Commestibilità*

Senza valore.

*Note*

Si potrebbe scambiare per *Sowerbyella radiculata* (Sow.: Fr.) Nannf., di colore giallo-crema-limone e con spore più piccole.