

45. *Coprinus picaceus* (Bull.: Fr.) S.F. Gray

[dal latino *pica*, “gazza”, per il colore del cappello che ricorda il piumaggio di tale uccello]

Classe *Basidiomycetes*
Subclasse *Hymenomycetidae*
Ordine *Agaricales*
Famiglia *Coprinaceae*



Cappello

40-80 mm di diametro, membranoso, ovale, conico-campanulato, mai piano, bruno fuliggine, annerente. Leggermente feltrato, variegato da grosse placche velari, irregolari, dissociate verso il margine, biancastre, con orlo striato in trasparenza.

Lamelle

Fitte, ventricose, libere, bianche, poi rosate, infine nerastre; presto deliquescenti come il resto del cappello.

Gambo

50-100 x 15-20 mm, snello, slanciato nel fungo adulto, cilindrico, ingrossato o bulboso alla base, presto vuoto, bianco, pruinoso, con delle decorazioni a zebraatura concolori al gambo.

Carne


Fragile, sottile, poco consistente, presto deliquescente; odore sgradevole di pece.

Microscopia

Spore 16-18 x 11-12 μm , ellittiche, grandi, nerastre, con evidente poro germinativo.

Habitat

Boschi di latifoglie (in prevalenza querce), ombreggiati, su terreno grasso; anche orti, estate-autunno.



Microscopia

Commestibilità

Senza interesse alimentare.

Note

Specie termofila, facilmente riconoscibile, cappello a sfondo bruno-marrone, con placche biancastre a frangia; apparentemente sembra essere consistente, ma alla raccolta ci si accorge che è di una delicata fragilità; cresce solitario o a piccoli gruppi.